

Abstrakt Anglisht-Shqip

Legal issues of prediction and protection of patients with violent behaviors in emergency psychiatry. the hcr-20 violence risk assessment scheme.

L. Sinani¹, V. Kola², F. Cenko², F. Elezi¹, K. Balaj³, P. Dervishi¹, G. Gjolena¹

¹Psychiatry, UHC 'Mother Tereza', ²Faculty of Medicine, Tirana University, Tirana, Albania, ³Psychiatric ward, Shkodwr.

Introduction: Psychiatrists are expected by their profession to make accurate violence assessments in their clinical practice. The absence of a test that could be used to predict violent behavior hampers proper decision in the case of emergency admissions, as well as discharge from the hospital, posing even many legal issues.

Goal: The purpose of violence risk assessment is to identify treatable and modifiable risk and protective factors that will inform the clinician's treatment and management of the patient.

Method: Prospective cohort study, during 24 weeks. Psychiatric evaluation based on structural clinical interviews and questionnaires related to violent behaviors and risk factors were conducted to patients admitted in psychiatric hospital on UHC "Mother Tereza" Tirana.

Results: According to our data, the relationship between violence and mental illness vary considerably across different diagnoses. The high rate of violence is reported in subjects with substance abuse disorder and personality disorder followed by Bipolar disorder and psychotic patients. Among the risk factors verified so far, the past violence behaviors reported show the highest predictive value.

Conclusions: HCR-20 tool has currently shown good results to roughly estimate probability of future violence and taking appropriate measures in order to prevent unwanted consequences.

Tema: Cështje ligjore të parashikimit dhe mbrojtjes të pacientëve me sjellje violente në urgjencën psikiatrike. Skema e vlerësimit të rrishtut për violencë HCR-20

L. Sinani¹, V. Kola², F. Cenko², F. Elezi¹, K. Balaj³, P. Dervishi¹, G. Gjolena¹

¹ Shërbimi Psikiatri QSU "Nënë Tereza" Tiranë; ² Fakulteti i mjekësisë. Universiteti Tiranë; ³ Pavioni psikiatrik Shkodër.

Hyrje: Prej profesionit të psikiatërve pritët që të bëhet një vlerësim i saktë violence në praktikën e tyre klinike. Mungesa e një testi që të mund të përdoret për të parashikuar violencën pengon në marrjen e një vendimi të duhur në rastet e shtrimeve urgjente apo edhe në daljet nga spitali, duke sjellë edhe mjaft cështje ligjore.

Qëllimi: Qëllimi i vlerësimit të rrishtut për violencë është të identifikojë faktorët e trajtueshëm dhe të modifikueshëm, të rrishtut dhe mbrojtës, të cilët do të informojnë klinikistin për trajtimin dhe menaxhimin e pacientit.

Metodologjia: Studim kohort prospektiv, 24 javor. Vlerësim psikiatrik i bazuar në intervista të strukturuar klinike dhe pyetsorë që lidhen me sjelljen violente dhe faktorët e rrishtut iu aplikuan pacientëve të shtruar në spitalin psikiatrik në QSU "Nënë Tereza" Tiranë.

Rezultatet: Sipas të dhënave tona, lidhja midis violencës dhe sëmundjeve mendore varion konsiderueshëm në diagnoza të ndryshme. Nivel i lartë violence raportohet në subjektet me çrregullime të shkaktuara nga abuzimi me substanca dhe çrregullimet e personalitetit të ndjekur nga çrregullimet bipolare dhe pacientët psikotik. Midis faktorëve të rrishtut të verifikuar, sjellja e kaluar violente raportohet të ketë vlerë të lartë parashikuese.

Konkluzionet: Pyetëtori HCR-20 ka demonstruar rezultate të mira në vlerësimin për probabilitetin e sjelljes violente në të ardhmen dhe në marrjen e masave të nevojshme me qëllim evitimin e pasojave të padëshirueshme.

Referenca:

Daniel W. Shuman, J.D. Britt Darwin-Looney, J.D. Legal Issues of Prediction, Protection, and Expertise pg 429. *Textbook of Violence Assessment and Management*

Robert I. Simon, M.D. Clinically-Based Risk Management of Potentially Violent Patients pg.555 *Textbook of Violence Assessment and Management*