

## ASPEKTET PSIQIKE TEK PACIENTËT EPILEPTIKË

S. Vranica, P.Vranica

**Qëllimi:** është të paraqiten aspektet më të shpeshta psiqike tek pacientët epileptikë.

**Metodologjia:** është përdorë metoda e intervistimit tek 100 pacientë epileptikë.

**Rezultatet:** nga 100 pacientë, 55 (55%) prej tyre kanë qenë të gjinisë mashkullore, ndërsa, 45 (45%) të gjinisë femërore. Pacientët meshkuj në 50% të rasteve kanë shprehë sindroma depresivë, 30% pengesa seksuale të përcjellur me impotencë, ndërsa 20%, brengosje hereditare. Pacientët femra, po ashtu, kanë shprehë sindroma depresivë në 40% të rasteve, në 40% të rasteve brengosje për trashëgmi, ndërsa në 20% të rasteve, frikë nga sulmi në publik.

**Diskutimi:** tek të dy gjinitë sindroma depresive është e shprehur në masë të shtuar, deri sa, tek meshkujt, më shumë dominojnë ankimet seksuale, tek femrat më e shprehur është brengosja hereditare. Tek meshkujt më pak është e shprehur brengosja hereditare, ndërsa tek femrat më pak paraqitet frika nga sulmi në publik.

**Përfundimet:** sipas të dhënave tona, më i shprehur është sindroma depresive tek të dy gjinitë, gjë që e shton për një nijansë më të shtuar edhe frikën nga tendencat suicidale.

**Rekomandimet:** Në këtë kontekst, pacientëve epileptikë, iu preferohet konsumimi i rregullt i terapisë antiepileptike si edhe medikamentet e ndryshme antidepressive.

## PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EPILEPTIC PATIENTS

S. Vranica, P. Vranica

**Goal :** to present the most common psychological aspects of the epileptic patients.

**Methodology:** the interview method was used on 100 epileptic patients.

**Results:** out of 100 patients, 55(55%) of them were males and 45(45%) were females. Male patients in 50% of the cases have expressed depressive syndrome, 30% sexual dysfunction followed by impotence, and 20% hereditary worries. Female patients, they also, expressed depressive syndrome in 40% of the cases, other 40% expressed hereditary concern, and 20% of them they were afraid of epileptic seizures happening in public spaces.

**Discussion :** in both sexes the depressive syndrome was very common, male patients were mostly preoccupied with the sexual dysfunctions, and the female patients were mostly preoccupied with hereditary anxiety. The male patients expressed less hereditary anxiety than the female patients, they expressed less fear of public seizures.

**Conclusion :** according to our data, in both males and females the depressive syndrome was the most common, this increases the fear of suicidal tendencies related with depression.

**Recommendations:** In this context, epileptic patients are preferred regular use of antiepileptic therapy as well as various antidepressant medications.

### Literature:

1. Chang, BS., Lowenstein, DH. (2003). "Epilepsy". *N Engl J Med* 349(13): 1257 – 66.
2. Chaplin, JE. et al. (1992). National General Practice Study of Epilepsy: the social and psychological effects of a recent diagnosis of epilepsy. *R Med J* 304: 1416 – 8.
3. Duncan, J. et al. (2006). "Adult Epilepsy". *Lancet* 367(9516): 1087 – 100.
4. Gillham, R. (1990). Refractory epilepsy: an evaluation of psychosocial methods in outpatient management. *Epilepsia* 31: 427 – 32.
5. Herman, BP. (1992). Quality of life in Epilepsy. *Journal of Epilepsy* 5(3): 153 – 65.
6. Levin, R. et al. (1998). Psychosocial dimensions in epilepsy: a review of the literature. *Epilepsia* 29: 805 – 16.
7. Phioplys, S. et al. (2007). "10-years research update review: psychiatric problems in children with epilepsy". *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 46(11): 1389 – 402.
8. Theo, P. et al. (2001). Social Functioning, Psychological Functioning and Quality of Life in Epilepsy. *Epilepsia* 42(9): 1160 – 8.